骨粗鬆症治療剤（内服剤）一覧表

分類		一般名	商品名	会社名	剤型・規格	薬価	用法・用量	適応症	作用機序
骨吸収抑制剤	ﾋﾞｽﾌｫｽﾌｫﾈｰﾄ	ｴﾁﾄﾞﾛﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ	ダイドロネル	大日本住友	錠 200mg	426.60	①200mg 1日1回（食間） 最高用量：400mg 投与期間：2週間 休薬期間：10～12週間 以上1ｸｰﾙ→周期間歇投与 ②800～1000mg 1日1回（食間） ③ 200mg 1日1回（食間） 最高用量：1000mg	①骨粗鬆症 ②下記状態における初期及び進行期の異所性骨化の抑制 Ⅰ．脊髄損傷後 Ⅱ．股関節形成術後 ③骨ﾍﾟｰｼﾞｪｯﾄ病	吸収抑制
		ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	フォサマック	MSD	錠 5mg	115.20	5mg 1日1回（朝起床時） 水約180mLとともに服用	骨粗鬆症	破骨細胞に直接作用し骨吸収抑制
			ボナロン	帝人	35mg	745.10	35mg 週1回（朝起床時） 水約180mLとともに服用		
		ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ	アクトネル	ｴｰｻﾞｲ	錠 2.5mg	126.20	①2.5mg 1日1回（起床時） 17.5mg 週１回 （起床時） 水約180mLとともに服用	①骨粗鬆症	
			ベネット	武田	17.5mg	767.20	②17.5mg 1日1回、起床時に水約180mLとともに8週間連日服用	②骨ﾍﾟｰｼﾞｪｯﾄ病	
		ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物	ボノテオ	ｱｽﾃﾗｽ	錠 1mg	133.70	1mg 1日1回（起床時） 水約180mLとともに服用	骨粗鬆症	
			リカルボン	小野					
	選択的ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ受容体ﾓｼﾞｭﾚｰﾀｰ（SERM）	ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ塩酸塩	エビスタ	中外ﾘﾘｰ	錠 60mg	132.20	60mg 1日1回	閉経後骨粗鬆症	骨のｴｽﾄﾛｹﾞﾝ受容体に選択的に作用し骨吸収抑制(乳腺･子宮には作用しない)
		ﾊﾞｾﾞﾄﾞｷｼﾌｪﾝ酢酸塩	ビビアント	ﾌｧｲｻﾞｰ	錠 20mg	132.20	20mg 1日1回		
	女性ﾎﾙﾓﾝ	ｴｽﾄﾘｵｰﾙ	エストリール	持田	錠 0.1mg 0.5mg 1mg	9.60 15.00 16.60	①1回1mg 1日2回 ②1回0.1～1mg 1日1～2回	①老人性骨粗鬆症 （0.1mg錠は適用なし） ②更年期障害、腟炎(老人､小児及び非特異性)､子宮頸管炎並びに子宮腟部びらん	ｴｽﾄﾛｹﾞﾝの低下を補い骨吸収抑制
		ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	ジュリナ	ﾊﾞｲｴﾙ	錠 0.5mg	63.70	①1mg 1日1回 ②0.5～1mg 1日1回	①閉経後骨粗鬆症 ②更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う下記症状 血管運動神経症状(Hot flush及び発汗)､腟萎縮症状	
		ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ	ウェールナラ	ﾊﾞｲｴﾙ	配合錠 1mg 0.04mg	157.50	1錠 1日1回	閉経後骨粗鬆症	
	ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ	ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ	オステン	武田	錠 200mg	41.20	1回200mg 1日3回	骨粗鬆症における骨量減少の改善	破骨細胞への直接作用とｶﾙｼﾄﾆﾝ分泌促進による骨吸収抑制

骨粗鬆症治療剤（内服剤）一覧表

分類		一般名	商品名	会社名	剤型・規格		薬価	用法・用量	適応症	作用機序
骨代謝改善剤	活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD$_3$	ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ	アルファロール	中外	ｶﾌﾟｾﾙ	0.25μg	25.50	①,②-Ⅰ 0.5～1μg 1日1回 ②-Ⅱ,Ⅲ 1～4μg 1日1回 ②-Ⅳ 0.008～0.1μg/kg 1日1回 ※小児用量は省略	①骨粗鬆症 （ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3μgを除く） ②下記疾患におけるﾋﾞﾀﾐﾝD代謝異常に伴う諸症状（低ｶﾙｼｳﾑ血症、ﾃﾀﾆｰ、骨痛、骨病変、しびれ、知覚異常、筋力低下等）の改善 Ⅰ.慢性腎不全 Ⅱ.副甲状腺機能低下症 Ⅲ.ｸﾙ病、骨軟化症 Ⅳ.未熟児（ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ液、ﾜﾝｱﾙﾌｧ液のみ） ※下線部はﾛｶﾙﾄﾛｰﾙのみ	腸管でのｶﾙｼｳﾑ吸収促進 腎でのｶﾙｼｳﾑ再吸収促進
						0.5μg	48.00			
						1μg	89.80			
						3μg	342.70			
					散	1μg	98.50			
					液	0.5μg	86.40			
			ワンアルファ	帝人	錠	0.25μg	25.30			
						0.5μg	47.00			
						1μg	85.50			
					液	0.5μg	80.60			
		ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ	ロカルトロール	中外=杏林	ｶﾌﾟｾﾙ	0.25μg	37.50	①1回0.25μg 1日2回 ②-Ⅰ 0.25～0.75μg 1日1回 ②-Ⅱ,Ⅲ 0.5～2μg 1日1回		
						0.5μg	67.70			
		ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙ	エディロール	中外= 大正富山	ｶﾌﾟｾﾙ	0.5μg	薬価基準 未収載	0.75μg 1日1回 症状により0.5μg 1日1回に減量	骨粗鬆症	
						0.75μg				
骨形成促進剤	ﾋﾞﾀﾐﾝK$_2$	ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ	グラケー	ｴｰｻﾞｲ	ｶﾌﾟｾﾙ	15mg	39.10	1回15mg 1日3回	骨粗鬆症における骨量・疼痛の改善	ｸﾞﾗ化したｵｽﾃｵｶﾙｼﾝの増加による骨形成促進と骨吸収抑制作用