







経皮吸収型虚血性心疾患治療剤一覧表

アステム社内資料
H22.10

商品名	ニトロダームTTS	ニトロテープ [®]	メイトランテープ [®]	パソルターテープ [®]	ジドレンテープ [®]	ミリステープ	フランドルテープ	アンタップR	
会社名	パルティス	杏林	協和発酵キリン	三和化学	東和=田辺三菱	日本化薬	アステラス	帝人	
一般名	ニトログリセリン					硝酸イソソルビド			
剤形	パッチ	テープ				テープ			
成分含有	25mg/10cm ²	27mg/1枚				5mg/1枚	40mg/1枚		
大きさ (貼付面積)									
適応症	狭心症					<ul style="list-style-type: none"> ・狭心症 ・急性心不全 (慢性心不全の急性増悪期を含む) 		<ul style="list-style-type: none"> ・狭心症 ・心筋梗塞 (急性期を除く) 	
投与量 (1回)	ニトログリセリンとして 25mg	ニトログリセリンとして 27mg				ニトログリセリンとして 5mg (1枚)	硝酸イソソルビドとして 40mg (1枚)		
投与回数	1日1回	1日1回				1日2回	1~2日に1回		
投与方法	胸部、腰部、上腕部のいずれかに貼付	胸部、腰部、上腕部のいずれかに貼付				胸部、上腹部、背部、上腕部 又は大腿部のいずれかに貼付	胸部、上腕部又は背部 のいずれかに貼付		
効果	発現時間	60分以内	30分以内				約30分	2hr	
	持続時間	24hr以上	24hr以上				12hr	24~48hr	
最高血中濃度 到達時間	1hr	3.6±0.8hr	6.9hr	2hr	13.1±8.0hr	9hr			
放出量	5mg/24hr (0.5mg/cm ² /24hr)	5mg/24hr	—	—	約15mg/24hr	—			
副作用発現率 及び 主な副作用 (剤形変更前の承認時)	13.5%	26.2%	—	21.6%	16.2%	30.0%			
	頭痛・頭重 11.5%	頭痛 10.7%	—	頭痛 10.1%	かぶれ 13.4%	頭痛 18.2%			
	そう痒 5.9%	頭重 2.5%	—	頭重 4.5%	頭痛 2.8%	皮疹 20.9%			
	発赤 8.2%	発赤 13.5%	—	そう痒 7.4%	GPT上昇 0.7%	そう痒 21.8%			
	かぶれ 1.0%	発疹 2.8%	—	発赤 5.6%	等	等			
	等	そう痒 8.5%	等	かぶれ 1.3%					

詳細は添付文書等をご参照ください

【参考】各添付文書、インビュフォーム、臨床と薬物治療 Vol. 19 No. 1 (2000)