α遮断薬（排尿障害）一覧表

アステム社内資料
H22.4

商品名	ユリーフ	フリバス・フリバスOD	ハルナールD	ミニプレス	ハイトラシン・バソメット	エブランチル
会社名	ｷｯｾｲ＝第一三共	旭化成ﾌｧｰﾏ	ｱｽﾃﾗｽ	ﾌｧｲｻﾞｰ	ｱﾎﾞｯﾄ・田辺三菱	科研＝三和化学
一般名	シロドシン	ナフトピジル	塩酸タムスロシン	塩酸プラゾシン	塩酸テラゾシン	ウラピジル
適応症	前立腺肥大症に伴う排尿障害	前立腺肥大症に伴う排尿障害	前立腺肥大症に伴う排尿障害	①本態性高血圧症 腎性高血圧症 ②前立腺肥大症に伴う排尿障害	①本態性高血圧症 腎性高血圧症 褐色細胞腫による高血圧症 ②前立腺肥大症に伴う排尿障害	①本態性高血圧症 腎性高血圧症 褐色細胞腫による高血圧症 ②前立腺肥大症に伴う排尿障害 ③神経因性膀胱に伴う排尿障害
用法・用量	1回 4mg 1日2回朝夕食後	1回 25～75mg （25mgから開始） 1日1回食後	1回 0.2mg 1日1回食後	1日1～6mg （1日1～1.5mgから開始） 2～3回に分服	①1日0.5～8mg （1日0.5mgから開始） 2回に分服 ②1日 1～2mg （1日1mgから開始） 2回に分服	①1日30～120mg 2回に分服 ②1日30～90mg 2回に分服 ③1日30～60mg 2回に分服 ＊全て、1日30mgから開始 ②③は1日最高90mgまで
剤形：薬価	《錠剤》 2mg：46.20 4mg：91.20	《錠剤・口腔内崩壊剤》 25mg：55.70 50mg：112.10 75mg：167.90	《口腔内崩壊剤》 0.1mg：78.40 0.2mg：155.20	《錠剤》 0.5mg：8.10 1mg：14.50	《錠剤》 0.25mg：12.30 0.5mg：20.70 1mg：37.20 2mg：75.70	《徐放性顆粒充填カプセル剤》 15mg：19.40 30mg：35.00
前立腺への選択性	選択性あり			選択性なし		
主な排泄経路	胆汁排泄	胆汁排泄	腎排泄	胆汁排泄	胆汁排泄	腎排泄
副作用 承認時発現率（症例数）	44.8%（391／873）	4.42%（27／611）	2.2%（104／4,724）※1,2	①9.21%（672／7,293）※1,2 ②2.53%（30／1,187）※1,2	①2.75%（292／10,626）※1,2 ②5.83%（336／5,761）※1,2	①6.54%(384／5,874) ※1,2 ②7.64%（309／4,047）※1,2 ③5.65%(19／336)
副作用 主な症状	射精障害、口渇、下痢、軟便 立ちくらみ、鼻閉、めまいなど	めまい、立ちくらみ、耳鳴 頭痛・頭重、便秘など	めまい、ふらふら感、胃不快感 など	めまい、立ちくらみ、心悸亢進 頻脈、起立性低血圧など	めまい、立ちくらみ、頭痛 悪心･嘔吐、倦怠感など	立ちくらみ、めまい、頭痛・頭重 動悸、ほてり、のぼせなど

※1:再審査終了時
※2:臨床検査値異常含む

詳細は添付文書等をご参照ください

【参考】各添付文書、インタビューフォーム